

AFAT - Anesthesia Facility Assessment Tool

Nombre del hospital

Fecha de llenado del formulario

Nombre de la persona que rellena el formulario

Teléfono

Correo electrónico

¿Cuál de los siguientes términos describe mejor su institución?

- Clínica
 Hospital Primario/ Distrital
 Hospital Secundario/ Regional
 Hospital de referencia nacional o terciario

¿Cuál de los siguientes términos describe mejor al proveedor de su institución?

- Público
 Privado
 Hospital Filantrópico
 Hospital Universitario

INFRAESTRUCTURA

¿Cuántas camillas de enfermería tiene en su institución?

- < 50
 50 - 99
 100 - 299
 300 - 499
 500 - 999
 > 999

¿Tiene su institución una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o una Unidad de Alta Dependencia (UAD)?

- No Sí

¿Tiene su institución una UCI o UAD para el cuidado de niños menores de 18 años?

- No Sí

¿Tiene su institución una ala de hospital dedicada a la atención de niños que se han sometido a procedimientos quirúrgicos?

- No Sí

¿Su institución tiene una unidad de cuidados post-anestesia o sala de recuperación anestésica?

- No Sí

¿Cuántas salas quirúrgicas tiene en su institución?

¿Tiene su institución una sala quirúrgica dedicada únicamente al tratamiento de niños?

- No Sí

¿Con qué frecuencia está disponible el oxígeno?

Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia hay agua corriente disponible?

Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia está disponible la electricidad?

Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia están disponibles los siguientes profesionales en su institución?

Anestesiólogo (especialista)

Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

Residente/ fellow de anestesia

Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

Médico anestesiólogo no especialista
Médico capacitado que no completó la residencia en anestesia

Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

Enfermera anestesista
Enfermera con residencia en anestesia

Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

Anestesta no médico y no enfermero
Profesional capacitado para administrar anestesia a los pacientes

Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

Cirujano (médico o no médico)

Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

En promedio, ¿cuál es la proporción de profesionales de enfermería por paciente en la UCI?

1:1-2
 1:3-4
 1:4-5
 1:5-10
 < 1:10
 N/A

En promedio, ¿cuál es la proporción de profesionales de enfermería por paciente en la sala posquirúrgica?

1:1-2
 1:3-4
 1:4-5
 1:5-10
 < 1:10
 N/A

En un momento dado, ¿cuál es la proporción aproximada de profesionales de enfermería por paciente en la sala de recuperación/Recuperación post-anestésica?

1:1-2
 1:3-4
 1:4-5
 1:5-10
 < 1:10
 N/A

HEMOCOMPONENTES

¿Las transfusiones de sangre se realizan en su Institución?

No
 Sí

¿Con qué frecuencia su Institución prueba os hemocomponentes (ABO/Rh) y realiza prueba cruzada?

Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia la bolsa de sangre total está disponibles para los pacientes en su Institución?

Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia el concentrado de glóbulos rojos está disponible para los pacientes en su Institución?

Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia la bolsa de plasma está disponible para los pacientes en su Institución?

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia la bolsa de plaquetas está disponible para los pacientes en su Institución?

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

¿Aproximadamente cuánto tiempo se tarda en obtener una concentración de glóbulos rojos (sangre total o concentrado de glóbulos rojos) en una emergencia?

- < 15 minutos
- < 1 hora
- 1-5 horas
- 5-10 horas
- 10-24 horas
- > 24 horas

¿Cuál es la fuente principal de la sangre utilizada en su Institución?

- Donantes voluntarios no remunerados
- Donantes remunerados
- Familiar de los pacientes
- Banco de sangre de fuera de la Institución
- Otro

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

¿Cuál es el método de registro de datos en registros médicos de su Institución?

- Electrónico
- Papel
- Ambos
- Ninguno

¿Con qué frecuencia se puede acceder a los registros médicos en múltiples visitas para el mismo paciente?

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia los detalles de cada anestesia (incluida la evaluación preoperatoria, planificación anestésica, gestión intraoperatoria y postoperatorio) se documentan en una ficha anestésica?

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia se recopilan datos prospectivamente para los eventos adversos del paciente en el postoperatorio, como infección del sitio quirúrgico, eventos anestésicos, etc.?)

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia la Institución realiza revisiones de morbilidad y mortalidad para mejorar la calidad?

- Nunca
- Cuando sea necesario
- Anualmente
- Cada 3 meses
- Mensualmente
- Anualmente

VOLUMEN DE CIRUGÍAS

¿Cuántos casos quirúrgicos se han realizado en el centro quirúrgico de su Institución en los últimos 12 meses?

¿Cuántos casos quirúrgicos se han realizado en niños (edad < 5 años) en su institución en los últimos 12 meses?

¿Cuántos casos se han realizado en niños (de < 1 año) en su institución en los últimos 12 meses?

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

¿Con qué frecuencia son evaluados los pacientes por un anestesiólogo (médico o no médico con capacitación en anestesia reconocido a nivel nacional) antes de la administración de anestesia?

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia la OMS (lista de verificación de seguridad quirúrgica) o la versión modificada localmente es utilizada en la sala de cirugía antes de cada procedimiento?

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia la oximetría de pulso continua utilizada para monitorear a los pacientes durante toda la duración de la atención anestésica en la sala de cirugía?

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia la capnografía se usa continuamente para monitorear pacientes durante toda la duración de la atención anestésica en la sala de cirugía?

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia la circulación sanguínea de los pacientes es monitoreado continuamente, ya sea por palpación, auscultación o visualización de frecuencia cardíaco (en un monitor) durante toda la duración de la atención anestésica en la sala de cirugía?

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia la presión arterial es medida por lo menos cada 5 minutos durante la administración de anestesia?

- Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia un asistente capacitado (por ejemplo, enfermero o técnico del centro quirúrgico) está disponible para apoyar al anestesiólogo en la sala?

- Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

¿Existe un protocolo de transición para la transferencia de atención de un anestesiólogo a otro en la sala de cirugía?

- No Sí

¿Con qué frecuencia las puntuaciones de dolor son evaluadas en niños por un profesional de la salud en las primeras 24 horas después de la operación?

- Nunca
 Una vez cada 12 horas
 Una vez cada 6-12 horas
 Una vez cada 4-6 horas
 Una vez cada 2-4 horas
 Cada hora

Si el hospital no tiene sala de recuperación post-anestésica, omita las siguientes 6 preguntas

¿Cuando los pacientes están presentes en la Unidad de recuperación post-anestésica, con qué frecuencia el personal está capacitado para administrar medicamentos analgésicos y reconocer el deterioro de las vías respiratorias y la hemodinámica físicamente presentes en la sala de recuperación post-anestésica?

- Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia la oximetría de pulso continua está disponible para el monitoreo continuo del paciente durante toda la duración de la atención en la sala recuperación post-anestésica?

- Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia la medición no invasiva de la presión arterial está disponible para todos los pacientes de la sala de recuperación post-anestésica?

- Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia el oxígeno está inmediatamente disponible en la sala de recuperación post-anestésica?

- Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia la succión (aspirador) está inmediatamente disponible en la sala de recuperación post-anestésica?

- Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

¿Con qué frecuencia el balón autoinflable con mascarilla está disponible inmediatamente en la sala de recuperación post-anestésica?

- Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

MEDICAMENTOS

¿Con qué frecuencia están disponibles los siguientes medicamentos, cuando sea necesario, en su hospital?

Fármacos antiinflamatorios no esteroideos

- Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

Paracetamol

- Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

Fentanilo

- Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

Morfina

- Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

Oxicodona

- Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

Tramadol

- Nunca (0%)
 Rara vez (1-25%)
 Algunas veces (26-50%)
 Frecuentemente (51-75%)
 Casi siempre (76-99%)
 Siempre (100%)

Naloxona

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Lidocaína

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Bupivacaína

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Ketamina

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Midazolam

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Profopól

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Tiopental

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Halotano

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Isoflurano

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Óxido nitroso

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Sevoflurano

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Atracurio

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Cisatracurio

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Pancuronio

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Rocuronio

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Succinilcolina

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Vecuronio

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Neostigmina

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Glicopirrolato

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Dexametasona

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Hidrocortisona

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Solución cristalóide isotónica

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Dextrosa 50%

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Amiodarona

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Atropina

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Dopamina

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Efedrina

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Epinefrina

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Furosemida

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Hidralazina

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Magnesio

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Metaraminol

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Norepinefrina

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Fenilefrina

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Bicarbonato de sodio

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Gluconato de calcio

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Dantroleno

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Insulina

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Intralipid IV (para intoxicación anestésica local)

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Salbutamol

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Ácido tranexámico

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

EQUIPOS

¿Con qué frecuencia está disponible y funcionando el siguiente equipo, cuando sea necesario, para anestesia o atención quirúrgica, en la sala de cirugía?

Balón autoinflable para ventilación en adultos con mascarilla facial

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Balón autoinflable para ventilación en niños con mascarilla facial

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Estetoscopio

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Termómetro

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Oxímetro de pulso

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Sensor de oximetría de pulso para adultos

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Sensor de oximetría de pulso para niños	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Oxígeno canalizado o cilindro	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Oxígeno concentrado	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Laringoscopio para adulto	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Laringoscopio para niños	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Bougie	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Protección ocular para el personal	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Bomba de infusión	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)

Catéter de aspiración (aspirador)

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Tubo endotraqueal (adultos)

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Tubo endotraqueal (pediátrico)

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Mascarillas laríngeas para adultos

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Mascarillas laríngeas para niños

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Vías respiratorias orales (cánula orofaríngea - adulto)

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Vías respiratorias orales (cánula orofaríngea pediátricas)

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Vías respiratorias nasales (cánula nasofaríngea)

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Kit de cricotiroidotomía/ traqueotomía de emergencia	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Dispositivo para medir la glucosa	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Dispositivo de medición de hemoglobina	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Autoclave	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Dispositivo de rayos X	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Refrigerador para medicamentos	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Mesas quirúrgicas con capacidad de inclinación	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Monitor para la medición no invasiva de la presión	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)

Mascarilla facial de varios tamaños	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Monitor de temperatura ambiente	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Capnografía de forma de onda continua	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
esfibrilador en funcionamiento (con paletas para adultos y niños)	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Monitor de electrocardiograma	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Electrodos de electrocardiograma	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Cánulas IV (18g, 20g, 22g y 24g)	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)
Pinzas de Magill	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Rara vez (1-25%) <input type="radio"/> Algunas veces (26-50%) <input type="radio"/> Frecuentemente (51-75%) <input type="radio"/> Casi siempre (76-99%) <input type="radio"/> Siempre (100%)

Sondas nasogástricas (10 - 16F)

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Dispositivo para calentamiento del paciente

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Circuitos respiratorios para anestesia en adultos

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

Circuito respiratorio para anestesia en niños

- Nunca (0%)
- Rara vez (1-25%)
- Algunas veces (26-50%)
- Frecuentemente (51-75%)
- Casi siempre (76-99%)
- Siempre (100%)

¿Cuántos equipos de anestesia hay disponible en su hospital?

Total de equipos para anestesias funcionando y disponibles

Comentarios adicionales que desee realizar
