

AFAT - Anesthesia Facility Assessment Tool

Nome do hospital

Data de preenchimento do formulário

Nome da pessoa que está preenchendo o formulário

Telefone

Email

Qual dos seguintes termos melhor descreve sua instituição?

- Clínica
 Hospital primário/ Distrital
 Hospital secundário/ Regional
 Hospital de referência nacional ou terciário

Quais dos seguintes termos melhor descreve o provedor da sua instituição?

- Público
 Privado
 Hospital Filantrópico
 Hospital Universitário

INFRAESTRUTURA

Quantos leitos de enfermaria tem na sua instituição?

- < 50
 50 - 99
 100 - 299
 300 - 499
 500 - 999
 > 999

Sua instituição tem Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou Unidade de Alta Dependência (UAD)?

- Não Sim

Sua instituição tem UTI ou UAD para cuidados de crianças menores de 18 anos?

- Não Sim

Sua instituição tem uma ala hospitalar dedicada ao cuidado de crianças que passaram por procedimentos cirúrgicos?

- Não Sim

Sua instituição tem unidade de cuidados pós-anestesia ou sala de recuperação anestésica?

- Não Sim

Quantas salas cirúrgicas tem na sua instituição?

Na sua instituição tem sala de cirurgia dedicada apenas ao atendimento de crianças?

- Não Sim

Com que frequência o oxigênio está disponível?

Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Com que frequência há água corrente disponível?

Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Com que frequência a eletricidade está disponível?

Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Com que frequência os seguintes profissionais estão disponíveis na sua instituição?

Médico anestesista (especialista)

Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Residente/ fellow de anestesia

Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Médico anestesista não especialista
Médico formado que não completou a residência em anestesia

Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Enfermeiro anestesista
Enfermeiro com residência em anestesia

Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Anestesista não-médico e não-enfermeiro
Profissional treinado para administrar anestesia aos pacientes

Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Profissional de cirurgia (médico ou não-médico)

Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Em média, qual a proporção de profissionais de enfermagem por paciente na UTI?

1:1-2
 1:3-4
 1:4-5
 1:5-10
 < 1:10
 N/A

Em média, qual é a proporção de profissionais de enfermagem por paciente na enfermaria pós-cirúrgica?

1:1-2
 1:3-4
 1:4-5
 1:5-10
 < 1:10
 N/A

A qualquer momento, qual é a proporção aproximada de profissionais de enfermagem por paciente na sala de recuperação/Recuperação Pós-Anestésica?

1:1-2
 1:3-4
 1:4-5
 1:5-10
 < 1:10
 N/A

HEMOCOMPONENTES

As transfusões de sangue são realizadas na sua Instituição?

Não
 Sim

Com que frequência sua Instituição testa os hemocomponentes (ABO/Rh) e faz uma prova cruzada?

Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Com que frequência a bolsa de sangue total está disponível para os pacientes na sua Instituição?

Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Com que frequência o concentrado de hemácias está disponível para os pacientes na sua Instituição?

Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Com que frequência a bolsa de plasma está disponível aos pacientes na sua Instituição?

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Com que frequência a bolsa de plaquetas está disponível para os pacientes na sua Instituição?

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Aproximadamente quanto tempo leva para conseguir um concentrado de hemácias (sangue total ou concentrado de hemácias) em uma emergência?

- < 15 minutos
- < 1 hora
- 1-5 horas
- 5-10 horas
- 10-24 horas
- > 24 horas

Qual é a fonte primária do sangue utilizado na sua Instituição?

- Doadores voluntários não remunerados
- Doadores remunerados
- Familiar de pacientes
- Banco de sangue de fora da Instituição
- Outro

GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO

Qual é o método de registro dos dados em prontuários da sua Instituição?

- Eletrônico
- Papel
- Ambos
- Nenhum

Com que frequência os prontuários podem ser acessados em várias visitas para o mesmo paciente?

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Com que frequência os detalhes de cada anestesia (incluindo avaliação pré-operatória, plano anestésico, gerenciamento intra-operatório e pós-operatório) são documentados em uma ficha anestésica?

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Com que frequência os dados são prospectivamente coletados para eventos adversos de pacientes no pós-operatório, tais como infecção de sítio cirúrgico, eventos anestésicos etc)?

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Com que frequência a Instituição conduz revisões de morbidade e mortalidade para melhoria da qualidade?

- Nunca
 Quando necessário
 Anualmente
 A cada 3 meses
 Mensalmente
 Anualmente

VOLUME DE CIRURGIAS

Quantos casos cirúrgicos foram realizados no centro cirúrgico na sua Instituição nos últimos 12 meses?

Quantos casos cirúrgicos foram realizados em crianças (com idade < 5 anos) na sua Instituição nos últimos 12 meses?

Quantos casos foram realizados em crianças (com idade < 1 ano) na sua Instituição nos últimos 12 meses?

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Com que frequência os pacientes são avaliados por um anestesista (médico ou não médico com treinamento em anestesia reconhecido nacionalmente) antes da administração da anestesia?

- Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Com que frequência o WHO (checklist de segurança cirúrgica) ou a versão modificada localmente é utilizada na sala de cirurgia antes de cada procedimento?

- Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Com que frequência a oximetria de pulso continua é usada para monitorar pacientes durante toda a duração do cuidado anestésico na sala de cirurgia?

- Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Com que frequência a capnografia é utilizada continuamente para monitorar pacientes durante toda a duração do cuidado anestésico na sala de cirurgia?

- Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Com que frequência a circulação sanguínea dos pacientes é continuamente monitorada, seja por palpação, ausculta ou exibição da frequência cardíaca (em um monitor) durante toda a duração do cuidado anestésico na sala de cirurgia?

- Nunca (0%)
 Raramente (1-25%)
 Algumas vezes (26-50%)
 Frequentemente (51-75%)
 Quase sempre (76-99%)
 Sempre (100%)

Com que frequência a pressão sanguínea é medida pelo menos a cada 5 minutos durante a administração da anestesia?

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Com que frequência um assistente treinado (por ex. enfermeiro ou técnico do centro cirurgico) está disponível para dar suporte ao anestesista em sala?

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Existe um protocolo de transição para a transferência do cuidado de um anestesista para outro na sala de cirurgia?

- Não
- Sim

Com que frequência os escores de dor são avaliados em crianças por um profissional de saúde nas primeiras 24 horas pós-operatórias?

- Nunca
- Uma vez a cada 12 horas
- Uma vez a cada 6-12 horas
- Uma vez a cada 4-6 horas
- Uma vez a cada 2-4 horas
- A cada hora

Se o hospital não tem sala de recuperação pós-anestésica, pular as próximas 6 questões

Quando os pacientes estão presentes na Unidade de recuperação pós-anestésica, com que frequência a equipe é treinada para administrar medicações analgésicas e reconhecer comprometimento das vias aéreas e hemodinâmico fisicamente presente na sala de recuperação pós-anestésica?

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Com que frequência a oximetria de pulso contínua está disponível para monitorização contínua do paciente por toda duração do cuidado na sala de recuperação pós-anestésica?

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Com que frequência a medida não invasiva da pressão arterial está disponível para todos os pacientes da sala de recuperação pós-anestésica?

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Com que frequência o oxigênio está imediatamente disponível na sala de recuperação pós-anestésica?

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Com que frequência a sucção (aspirador) está imediatamente disponível na sala de recuperação pós-anestésica?

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Com que frequência o balão auto inflável com máscara está imediatamente disponível na sala de recuperação pós-anestésica?

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

MEDICAÇÕES

Com que frequência as seguintes medicações estão disponíveis, quando necessárias, no seu hospital?

Anti-inflamatórios não esteroidais

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Paracetamol

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Fentanil

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Morfina

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Oxycodona

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Tramadol

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Naloxona

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Lidocaína

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Bupivacaína

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Cetamina

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Midazolam

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Profopól

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Tiopental

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Halotano

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Isoflurano

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Óxido Nitroso

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Sevoflurano

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Atracúrio

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Cisatracúrio

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Pancurônio

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Rocurônio

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Succinilcolina

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Vecurônio

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Neostigmina

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Glicopirrolato

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Dexametasona

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Hidrocortisona

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Solução cristalóide isotônica

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Dextrose 50%

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Amiodarona

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Atropina

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Dopamina

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Efedrina

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Epinefrina

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Furosemda

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Hidralazina

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Magnésio

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Metaraminol

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Norepinefrina

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Fenilefrina

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Bicarbonato de sódio

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Gluconato de cálcio

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Dantrolene

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Insulina

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Intralipid IV (para intoxicação por anestésico local)

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Salbutamol

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Ácido tranexâmico

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

EQUIPAMENTOS

Com que frequência os seguintes equipamentos estão disponíveis e em funcionamento, quando necessários, para anestesia ou cuidados cirúrgicos, na sala de cirurgia?

Balão auto inflável para ventilação em adultos com máscara facial

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Balão auto inflável para ventilação em crianças com máscara facial

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Estetoscópio

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Termômetro

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Oxímetro de pulso

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Sensor de oximetria de pulso para adultos

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Sensor de oximetria de pulso para crianças	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Oxigênio canalizado ou cilindro	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Oxigênio concentrado	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Laringoscópio para adulto	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Laringoscópio para crianças	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Bougie	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Proteção de olhos para a equipe	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Bomba de infusão	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)

Cateter de sucção (aspirador)

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Tubo endotraqueal (adultos)

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Tubo endotraqueal (pediátrico)

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Máscaras Laríngeas para Adultos

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Máscaras Laríngeas para crianças

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Vias aéreas orais (cânula orofaríngea - adulto)

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Vias aéreas orais (cânula orofaríngea - pediátricas)

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Vias aéreas nasais (cânula nasofaríngea)

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Kit de cricotiroidotomia/ traqueostomia de emergência	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Dispositivo para medida da glicose	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Dispositivo para medida da hemoglobina	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Autoclave	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Aparelho de Raio-X	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Refrigerador para medicamentos	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Mesas cirúrgicas com capacidade de inclinação	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Monitor para medida não invasiva da pressão arterial	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)

Máscara facial de vários tamanhos	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Monitor de temperatura ambiente	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Capnografia com forma de onda contínua	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Desfibrilador em funcionamento (com pás para adultos e crianças)	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Monitor de eletrocardiograma	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Eletrodos de eletrocardiograma	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Cânulas IV (18g, 20g, 22g e 24g)	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)
Pinças de Magill	<input type="radio"/> Nunca (0%) <input type="radio"/> Raramente (1-25%) <input type="radio"/> Algumas vezes (26-50%) <input type="radio"/> Frequentemente (51-75%) <input type="radio"/> Quase sempre (76-99%) <input type="radio"/> Sempre (100%)

Sondas nasogástricas (10 - 16F)

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Dispositivo para aquecimento de pacientes

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Circuitos de respiração para anestesia em adultos

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Circuito de respiração para anestesia em crianças

- Nunca (0%)
- Raramente (1-25%)
- Algumas vezes (26-50%)
- Frequentemente (51-75%)
- Quase sempre (76-99%)
- Sempre (100%)

Quantos equipamentos de anestesia estão disponíveis no seu hospital?

Total de equipamentos para anestesia funcionando e disponíveis

Comentários adicionais que desejar

Cadastro do Investigador Principal - Brasil

DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome da Instituição / Hospital

Endereço da Instituição

(ex.: Av Dr Eneas de Carvalho, 44 - Bloco I -
1.andar)

Cidade

CEP

Região do país

- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Nordeste
- Região Norte
- Região Centro-Oeste

Estado Região Sudeste

- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Minas Gerais
- Espírito Santo

Estados Região Sul

- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul

Estados Região Nordeste

- Bahia
- Ceará
- Rio Grande do Norte
- Paraíba
- Pernambuco
- Alagoas
- Sergipe
- Piauí
- Maranhão

Estados Região Norte

- Amazonas
- Pará
- Roraima
- Amapá
- Acre
- Rondônia
- Tocantins

Estados Região Centro-Oeste

- Goiás
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Distrito Federal

DADOS DO INVESTIGADOR PRINCIPAL / PESQUISADOR LOCAL RESPONSÁVEL

Nome COMPLETO do Investigador Principal

Nome para publicação

(obs.: nome usado nas autorias de artigos e publicações científicas.)

E-mail do Investigador Principal

Telefone celular do Investigador Principal

(ex.: (11) 9-1234-5678)

Cadastro de Subinvestigadores / Equipe de Pesquisa - Brasil

DADOS DA EQUIPE DE PESQUISA / SUB-INVESTIGADORES

Nome COMPLETO do Sub-investigador

Nome na publicação

Telefone celular do Subl 1

E-mail do Subl 1

Deseja incluir mais 1 subinvestigador?

Não Sim

Nome COMPLETO do Sub-investigador 2

Nome na publicação

Telefone celular do Subl 2

E-mail do Subl 2

Deseja incluir mais 1 subinvestigador?

Não Sim

Nome COMPLETO do Sub-investigador 3

Nome na publicação

Telefone celular do Subl 3

E-mail do Subl 3

Deseja incluir mais 1 subinvestigador?

Não Sim

Nome COMPLETO do Sub-investigador 4

Nome na publicação

Telefone celular do Subl 4

E-mail do Subl 4

Deseja incluir mais 1 subinvestigador?

Não Sim

Nome COMPLETO do Sub-investigador 5

Nome na publicação

Telefone celular do Subl 5

E-mail do Subl 5

Registro del Investigador Principal - Latino-America

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

Nombre del Hospital / Institución

Dirección del Hospital / Institución

(ej.: Avenida Eneas de Carvalho Aguiar, 44)

País

Ciudad

Código Postal

(zipcode)

INFORMACIONES DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL / RESPONSABLE

Nombre COMPLETO del Investigador Principal

Nombre oficial para publicación

(obs.: Nombre usado en los artículos científicos
(autoría).)

E-mail del Investigador Principal

Teléfono móvil del Investigador Principal

(Obs.: Escribir el código internacional con el
código de área y el número móvil.)

Registro de Subinvestigadores / Equipo de Investigación - Latino-America

REGISTRO DE SUBINVESTIGADORES / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Nombre COMPLETO del Subinvestigador

Nombre oficial para publicación

(obs.: Nombre usado en los artículos científicos (autoría).)

E-mail del Subinvestigador

Teléfono móvil del Subinvestigador

(Obs.: Escribir el código internacional con el código de área y el número móvil.)

Hay más subinvestigadores ?

Sim Não

Nombre COMPLETO del Subinvestigador (2)

Nombre oficial para publicación (2)

(obs.: Nombre usado en los artículos científicos (autoría).)

E-mail del Subinvestigador (2)

Teléfono móvil del Subinvestigador (2)

(Obs.: Escribir el código internacional con el código de área y el número móvil.)

Hay más subinvestigadores ?

Sim Não

Nombre COMPLETO del Subinvestigador (3)

Nombre oficial para publicación (3)

(obs.: Nombre usado en los artículos científicos (autoría).)

E-mail del Subinvestigador (3)

Teléfono móvil del Subinvestigador (3)

(Obs.: Escribir el código internacional con el código de área y el número móvil.)

Hay más subinvestigadores ?

Sim Não

Nombre COMPLETO del Subinvestigador (4)

Nombre oficial para publicación (4)

(obs.: Nombre usado en los artículos científicos (autoría).)

E-mail del Subinvestigador (4)

Teléfono móvil del Subinvestigador (4)

(Obs.: Escribir el código internacional con el código de área y el número móvil.)

Hay más subinvestigadores ?

Sim Não

Nombre COMPLETO del Subinvestigador (5)

Nombre oficial para publicación (5)

(obs.: Nombre usado en los artículos científicos (autoría).)

E-mail del Subinvestigador (5)

Teléfono móvil del Subinvestigador (5)

(Obs.: Escribir el código internacional con el código de área y el número móvil.)

Hay más subinvestigadores ?

Sim Não

Nombre COMPLETO del Subinvestigador (6)

Nombre oficial para publicación (6)

(obs.: Nombre usado en los artículos científicos (autoría).)

E-mail del Subinvestigador (6)

Teléfono móvil del Subinvestigador (6)

(Obs.: Escribir el código internacional con el código de área y el número móvil.)

Si hay más subinvestigadores (más personas en su equipo), por favor envíe el listado completo para e-mail aro@incor.usp.br